

Увеличивать нормы, но осторожно

Затяжной характер весны определило и смещение календарных сроков проведения ранних полевых работ

Весна оказалась затяжной, холодной, с ночными заморозками. Если в Брестской и частично в Гродненской областях снег сошел в конце первой — начале второй декады марта, в Минской и Гомельской — в начале третьей декады, то в восточных районах Витебской и Могилевской областей только на стыке первой и второй декад апреля. Поэтому созревание и готовность почвы к обработке в республике растянулась практически на месяц, в то время как обычно это происходило в течение 10—14 дней.

Затяжной характер весны определило и смещение календарных сроков проведения ранних полевых работ в разрезе областей. Начало массового сева (5 проц. площади) в Брестской области отмечено 21 марта, Гродненской — 27, Гомельской и Минской — 31 марта, Могилевской — 15 апреля и Витебской областей — 17 апреля.

И если на Брестчине, Гомельщине и Гродненщине, как видно из публикуемой сводки, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже завершен, то на Могилевщине, и особенно на Витебщине, из-за поздней весны и избыточной влажности почвы эти работы, судя по всему, будут завершены в первой декаде мая.

Как действовать в таких условиях земледельцам? С этим вопросом корреспондент «БН» обратился к специалистам [НПЦ НАН Беларуси по земледелию](#). По мнению ученых, при севе после оптимальных сроков есть опасность снижения полевой всхожести. Поэтому рекомендуется повышать в пределах 15 проц. рекомендованные нормы высева семян.

При этом следует помнить, что полностью компенсировать неблагоприятное воздействие внешних факторов оптимизацией нормы высева нельзя. Уровень ее увеличения имеет свои допустимые пределы — не более 15 процентов, после которых дальнейшее повышение приводит к снижению урожайности.

Временный дефицит азотных удобрений в хозяйстве не должен сдерживать сев яровых зерновых культур, поскольку внести азотные удобрения можно в подкормку вплоть до начала выхода растений в трубку.

Добиться значительной компенсации недобора зерна при посеве после оптимальных сроков сева за счет изменения структуры посевных площадей ранних яровых зерновых культур практически невозможно, поскольку все они примерно одного уровня потенциала урожайности. Хотя в более теплых южных районах Могилевской и Витебской областей возможно частичное увеличение площадей кукурузы на зерно как более урожайной зерновой культуры.

Минимизация недобора урожая ранних зерновых культур может быть обеспечена только своевременным и качественным проведением всех дальнейших мероприятий по уходу за посевами.

Анатолий ЦЫБУЛЬКО