

Источник: «Комсомольская правда» - 2012-05-26

Защищаем сад от непрошенных гостей

Елена Зуева



Как вылечить плодовый сад от напасти мха, какие сорта яблонь лучше подходят для дачного сада, читателям «КП» рассказал Виталий Васеха, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник [РУП «Институт пловодства»](#).

Здоровье растений надо укреплять

- На деревьях, кустарнике и даже на заборе распространяется какой-то мох желто-зеленого цвета. Стволик деревца или ветка куста после того, как на него поселился этот мох, высыхает и отмирает. Так погиб куст красной смородины. При опрыскивании до распускания почек раствором железного купороса развитие моха как бы приостанавливается, но осенью и весной мох активизируется. Подскажите, чем обработать или что применить более эффективное?

Борис Щеснович. Минск.

- Из перечня препаратов, внесенных в реестр и разрешенных к применению, наиболее эффективно для борьбы со мхом применять азофос или любые другие медьсодержащие препараты (типа медного купороса). Лучше всего это делать в начале вегетации и провести как минимум две обработки. Первую - при устойчивом переходе погоды к положительным температурам, до распускания почек обработать ветки медьсодержащим препаратом, и второй раз провести обработку при набухании почек. Рекомендация подходит как для деревьев, так и кустарников.

Стоит также провести обработку медьсодержащим препаратом в конце вегетации: после сбора урожая в начале листопада. Это не только поможет справиться с заболеванием, но и будет хорошей профилактикой против других заболеваний.

Не стоит забывать, что развитие мха связано с низкой культурой садоводства на участке. Соответственно, проведение ряда других защитных мероприятий, прежде всего использование фунгицидов в течение всего вегетационного периода в необходимую фазу, также будет способствовать укреплению здоровья растений и лучшей устойчивости ко мху.

Если болезнь обрела массовое развитие, то стоит наиболее угнетенные ветви удалить и сжечь. Делать это лучше всего в конце зимы или ранней весной.

Среднерослые яблони доставляют меньше хлопот

- Подскажите названия среднерослых сортов яблонь, слив, груш, которые можно купить в хороших питомниках, чтоб была гарантия качества.

Людмила Алимова. Минск.

- Я бы посоветовал вам покупать саженцы плодовых деревьев, которые районированы в нашей республике или переданы на государственное сортоиспытание. Это значит, что сорта успешно растут в наших условиях и пригодны для белорусского климата.

Но нужно четко понимать, что для плодовых культур понятие средняя сила роста означает высоту дерева в пределах 2,5 - 3 м. На сегодняшний день абсолютное большинство сортов из современного сортимента яблони обладают средней силой роста, а некоторые даже слаборослые. Плюс ко всему они еще и скороплодные: уже на третий год можно получить урожай. При выборе сорта я бы порекомендовал остановиться на современных достижениях отечественной селекции, так как эта группа сортов более адаптивна к нашему климату, чем интродуценты. Средней силой роста обладают следующие сорта яблони: «Елена», «Коваленковское» (летние), «Лучезарное» (осеннее), зимние - «Белорусское сладкое», «Вербное», «Дарунак», «Имант», «Надзейны», «Память Коваленко».

Груша, как правило, сильнорослая культура, что объясняет более скромный выбор сортов с данной группы. Средней силой роста из ранних сортов груш обладают

«Духмяная» и «Забава», из группы средних сроков созревания - «Ясачка» (при должном уходе дерево больше 2 - 2,5 м не вырастает), из поздних - «Белорусская поздняя Белсад».

В районированном ассортименте сливы с ярко выраженной средней силой роста деревьев стоит выделить из сортов среднего срока созревания «Венгерка белорусская», «Венера» и «Кромань»; из позднего срока созревания хорош сорт «Стенли» американской селекции.

При покупке не забывайте требовать сортовое свидетельство на приобретаемый саженец, а также заключение семенной и карантинной инспекции, подтверждающее высокое качество приобретаемого материала.

НА ЗАМЕТКУ

Не нужно путать среднерослость дерева как биологическую особенность сорта (сила роста находится на среднем уровне) и различные клоновые подвои, которые в той или иной мере снижают силу роста дерева. Как правило, все подвои можно разделить на три группы: карликовые, среднерослые и сильнорослые. Необходимо понимать, что если у дерева средняя или слабая сила роста является биологической особенностью сорта, то данный признак в той или иной степени должен проявиться на любом подвое. Конечно, подвой накладывает свой отпечаток. В карликовых подвоях деревья будут меньшего роста, чем, допустим, на среднерослых подвоях. Наиболее часто посадочный материал вы можете встретить на таких среднерослых подвоях яблони, как 54-18 и ММ-106, груши - ВА-29, сливы - ВПК-1.

На заметку

Как и когда защищать сад от вредителей

Культура	Фенологическая фаза ¹	Вредитель	Рекомендуемый препарат для защиты ²
Яблоня	зеленый конус - мышинное ухо	цветоед	Би-58 новый; Децис; Фастак; Актара
	выдвижение и обособление бутонов; при появлении в течение периода вегетации	тля и листогрызущие	Би-58 новый; Танрек; Актара; Биотлин
	конец цветения - лесной орех	пилильщик	Фастак; Децис
	грецкий орех -	плодожорка	Децис; Фастак;

	рост плодов		Актара; Тарзан; Инта-вир
	зеленый конус - мышинное ухо	цветоед	Би-58 новый; Децис; Фастак; Актара
Груша	выдвижение и обособление бутонов; при появлении в течение периода вегетации	тля и листогрызущие	Би-58 новый; Танрек; Актара; Биотлин
	при появлении в течение периода вегетации	медяница	Волиам тарго; Актара; Фастак; Би-58 новый
	грецкий орех - рост плодов	плодожорка	Децис; Фастак; Актара; Тарзан
Вишня	начиная с зеленого конуса и при появлении в течение периода вегетации	тля и листогрызущие	Би-58 новый; Танрек; Актара; Биотлин
Черешня	после сбора урожая	вишневый слизистый пилильщик	Децис; Фастак; Би-58 новый
Слива	при появлении в течение периода вегетации	тля и листогрызущие	Би-58 новый; Танрек; Актара; Биотлин
Алыча	конец цветения	пилильщик	Фастак; Децис
	2 - 3 недели после цветения	плодожорка	Фастак; Тарзан; Инта-вир; Актара

Примечание:

¹ - в зависимости от метеорологических условий периода вегетации появление вредителей не обязательно приурочено к определенной фенологической фазе плодовой культуры;

² - перед применением любого препарата необходимо обязательно учитывать период ожидания и срок созревания культуры. В течение периода вегетации необходимо чередовать применяемые инсектициды.