

Попробуй новинку

Уважаемые земледельцы!

В технологии выращивания озимого рапса важное место отводится борьбе с засоренностью посевов сорняками, которые достаточно сильно угнетают растения на первых стадиях роста и развития (потери от сорняков могут достигать 60 процентов и более). Будущий урожай в основном зависит от защиты посевов рапса в осенний период. Подготовка почвы к севу, посев в оптимальные сроки, своевременное внесение гербицидов для защиты посевов, создание всех необходимых условий для успешного развития рапса и его перезимовки — все это составляющие будущего урожая.

Осенью наиболее конкурентными для рапса сорняками на полях являются виды осотов, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, василек синий, падалица зерновых культур. Если не контролировать эти сорняки, то рапс не сможет конкурировать с ними, что может привести к вытягиванию точки роста над поверхностью почвы и, соответственно, к ослаблению развития корневой системы. А это увеличивает риск вымерзания рапса, ведь крепкая корневая система является залогом успешной зимовки.

Борьба с сорняками способствует снижению влажности семян, повышению их качества, уменьшению затрат при уборке, а также уничтожению растений, являющихся хозяевами возбудителей многих болезней и вредителей.

В республике до 2012 года зарегистрировано много препаратов для защиты озимого рапса. Однако большинство из них неэффективно контролирует многолетние сорняки из семейства астровых, в частности, осот полевой (*Sonchus arvensis* L.). На посевах рапса возможно применение гербицидов на основе клопиралида, например, Лонтрел Гранд, ВДГ, который надежно искореняет осот полевой. Однако спектр действия клопиралида достаточно ограничен. Устойчивым к данному действующему веществу является подмаренник цепкий (*Galium aparine* L.), способный конкурировать с рапсом, уменьшать урожай и качество семян. Не чувствительны к клопиралиду также сорняки из семейства маревых и амарантовых, в частности, наиболее распространенные представители этих семейств — марь белая (*Chenopodium album* L.) и щирица обыкновенная (*Amaranthus retroflexus* L.).



■ Действие ГАЛЕРА СУПЕР на подмаренник цепкий.

Для осуществления целенаправленного контроля всех вышеперечисленных видов сорных растений компания Сингента предлагает для осеннего применения новый системный послевсходовый гербицид ГАЛЕРА СУПЕР 364, ВР. В состав гербицида входят три действующих вещества: 267 г/л клопиралида + 80 г/л пиклорама + 17 г/л аминопиралида.

Исследования по изучению эффективности ГАЛЕРА СУПЕР 364, ВР, проводимые на опытном поле РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси, показали высокую результативность препарата ГАЛЕРА СУПЕР, уверенно контролирующего такие сорные растения, как подмаренник цепкий, ромашка непахучая, василек синий, горец вьюнковый, марь белая, осот полевой. Полученные данные свидетельствуют о гибели вышеперечисленных сорняков на уровне 90-100 процентов. Наиболее оптимальным временем применения данного гербицида является фаза 4-6 листьев у рапса осенью.

Эффективность гербицида ГАЛЕРА СУПЕР мало зависит от наличия влаги в почве, так как он вносится по всходам рапса и сорных растений. Более того, применение гербицида ГАЛЕРА СУПЕР по всходам рапса позволяет снять напряженность работ во время посевной. ГАЛЕРА СУПЕР, благодаря наличию в своем составе аминопиралида — нового действующего вещества — обладает почвенным действием, позволяющим контролировать и проростки сорняков. Норма внесения гербицида ГАЛЕРА СУПЕР на посевах озимого рапса осенью — 0,2-0,3 л/га.

При смешанном характере засорения посевов злаковыми, в частности, пыреем ползучим, и


● повсходовый гербицид для обработки РАПСА осенью в фазу 4-6 листьев культуры

● ТРИ действующих вещества

● ЭФФЕКТИВЕН против ПОДМАРЕННИКА цепкого, ИСКОРЕНЯЕТ осоты

● эффективность НЕ ЗАВИСИТ от влажности почвы

ГАЛЕРА СУПЕР: КУРС – ЧИСТОЕ ПОЛЕ!



Галера Супер

syngenta

Представительство АО «Syngenta Agro Services AG» в Республике Беларусь:
220007 г. Минск, ул. Могилевская, 20. Тел. (8-017) 228-14-22, факс (8-017) 228-14-20
По вопросам приобретения — тел. (8-017) 228-14-24, применения — тел. (8-017) 219-07-37
www.syngenta.by

двудольными сорняками, а также контроле падалицы зерновых в посевах рапса гербицид ГАЛЕРА СУПЕР целесообразно применять в баковой смеси с граминицидами — Фюзилад Форте или Зеллек Супер. Норма внесения граминицидов в смеси с гербицидом ГАЛЕРА СУПЕР должна быть в пределах рекомендованной и будет зависеть от засорения посева одно- или многолетними злаковыми сорняками.

ГАЛЕРА СУПЕР зарегистрирован также и для весеннего применения на яровом (фаза 4-6 листьев) и озимом (до фазы скрытого бутона 1 см в диаметре) рапсе.

Применение гербицида ГАЛЕРА СУПЕР позволит уверенно получать высокие урожаи рапса на ваших полях.

Заказывайте препарат у наших официальных дистрибьюторов.

Г. И. БИНЬКО,
руководитель Отдела клиентского маркетинга
Представительства Сингента

