

# Чтобы помидоры выросли румяными, подкормите их калием

**О главных работах на грядках в конце июля читателям «Комсомолки» рассказали специалисты**



Для того чтобы получить хороший урожай, сейчас нужно выполнить несложные, но важные работы. Мы узнали, почему чеснок надо сушить луковичками на юг, не вредно ли подкармливать огурцы и помидоры удобрениями во время плодоношения и как защитить растения от болезней, при этом не напичкав их химией.

## Если чеснок не убрать вовремя, он будет плохо храниться

- Сейчас самое время для уборки чеснока, - говорит Николай Петрович КУПРЕЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства». - Нельзя дожидаться, чтобы он перезрел и развалился в почве на части - в этом случае он будет хуже храниться. Как определить тот момент, когда чеснок нужно срочно убирать? Начинают желтеть листья, и если осталась стрелка, то покрывало на воздушных луковичках уже начинает растрескиваться. А воздушные луковички приобретают характерную для сорта окраску, как и

кроющие чешуи самих лукович. Если у вас есть возможность оставить чеснок на грядке и погода позволяет это сделать, то разложите его, располагая луковичками на юг, так они будут лучше сохнуть на солнце. Периодически переворачивайте чеснок, чтобы лучше его подсушить. Если погода будет стоять дождливой, то разложите ваш урожай под навесом или на чердаке. Нужно, чтобы это место было хорошо проветриваемым. Не забывайте переворачивать, чтобы не образовывалась плесень. Сушить чеснок нужно в течение двух недель, после чего листья можно обрезать.

## Фитофтора - враг помидора

Помидоры уже начали созревать, но это не означает, что можно расслабиться и спокойно ждать плодов. Впереди битва за урожай с одним из самых распространенных заболеваний - фитофторой.

- Сейчас, в начале плодоношения томатов, нужно обработать их контактными препаратами против фитофторы - «Пенкоцебом», «Фундазолом» или бордоской жидкостью, - рассказал заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощевод-

## Спасаем репчатый лук от пероноспороза

Чтобы получить хороший урожай репчатого лука, сейчас очень важно защитить его от опасного заболевания - пероноспороза. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, может поражать все виды лука - батун, шалот, порей. У растений на листьях появляются светло-зеленые или желтоватые расплывчатые пятна, покрытые серовато-фиолетовым налетом. Такие растения останавливаются в росте, их листья желтеют и увядают. Сильнее всего болезнью развивается при высокой влажности воздуха. В дождливую погоду на поверхности листьев появляются споры гриба в виде серовато-фиолетового налета, который хорошо заметен рано утром, пока не высохла роса. К моменту отмирания листьев инфекция проникает в луковичу, в результате чего они не вырастают до нужных размеров, а также плохо хранятся.

- Чтобы сохранить и защитить урожай лука, для борьбы с пероноспорозом используйте разрешенные для применения препараты, например «Азофос», - советует Николай Петрович КУПРЕЕНКО. - Кроме того, сейчас, в конце июля, можно подкормить лук, но только фосфорными или калийными удобрениями. Азотные удобрения сейчас ни в коем случае нельзя давать растениям.

Чтобы получить хороший урожай репчатого лука, сейчас очень важно защитить его от опасного заболевания - пероноспороза. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, может поражать все виды лука - батун, шалот, порей. У растений на листьях появляются светло-зеленые или желтоватые расплывчатые пятна, покрытые серовато-фиолетовым налетом. Такие растения останавливаются в росте, их листья желтеют и увядают. Сильнее всего болезнью развивается при высокой влажности воздуха. В дождливую погоду на поверхности листьев появляются споры гриба в виде серовато-фиолетового налета, который хорошо заметен рано утром, пока не высохла роса. К моменту отмирания листьев инфекция проникает в луковичу, в результате чего они не вырастают до нужных размеров, а также плохо хранятся.

## Огурцам и перцам нужна подкормка

- Огурцы сейчас нужно обязательно подкормить, - говорит Мечислав Францевич. - Сначала внесите азотные удобрения (30 - 40 г нужно растворить на ведро воды, из расчета на 50 кустов), а через четыре дня подкормить монофосфатом калия (50 г препарата растворить на ведро воды, из расчета на 50 растений). Подкормки нужно вносить непосредственно под корень.

Очень любят удобрения и перцы - запланируйте 2 - 3 подкормки микроудобрением «Наноплант» или препаратом «Гидрогумин». Вносить подкормки можно и в период плодоношения - это безвредно для человека. Для того чтобы перцы начали быстрее плодоносить, удаляйте пасынки. Баклажаны подкармливают точно так же, как и перцы.

## Защищаем капусту от вредителей

А капусту сейчас атакуют вредители - и тля, и белянки, и капустная моль. Чтобы защитить позднюю капусту, которую планируете оставить на хранение, обработайте ее препаратами «Карате», «Децис».

## КСТАТИ

У вас есть дачные вопросы? Пишите по адресу: [dacha@phkp.by](mailto:dacha@phkp.by) или звоните по телефону: (017) 294 80 74 по будним дням с 10.00 до 11.00.

Ирина КАЛИНИНА.