

ВТОРОЙ УРОЖАЙ

Михаил ПЕТРОВСКИЙ

Погодные условия позволяют получить в нынешнем году второй урожай ряда кормовых культур в пожнивных посевах после рано убираемых на зерно зерновых — озимой ржи, озимой пшеницы, озимого тритикале, ячменя. Пожнивные культуры можно использовать на силос, для приготовления обезвоженных кормов, на зеленую подкормку, отмечают специалисты РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию».

Чтобы обеспечить хороший урожай с пожнивных посевов, следует уделять внимание правильному подбору культур, которые должны быстро наращивать зеленую массу и быть холодостойкими. В качестве пожнивных рекомендуется возделывать главным образом крестоцветные культуры, поскольку редька масличная, озимый и яровой рапс, озимая и яровая сурепица отличаются сравнительно быстрым наращиванием зеленой массы. Например, период от всходов до цветения редьки масличной составляет 50—60 дней, она хорошо переносит заморозки.

Крестоцветные могут использоваться на зеленую подкормку вплоть до образования снежного покрова. Как показывает практика, до наступления холодов крестоцветные культуры наращивают в среднем 140—200 ц/га зеленой массы, обеспечивая 16—23 ц/га сухого вещества.

Получение двух урожаев с одной и той же площади в один год возможно только при внесении в почву достаточного количества удобрений. Нельзя допускать разрыва между уборкой основной культуры, обработкой почвы и посевом пожнивной культуры. Это приводит к иссушению верхнего слоя почвы, что отрицательно сказывается на прорастании семян, получении всходов и урожаев. Обработка почвы под пожнивные культуры зависит от ее влажности и гранулометрического состава.

Наряду с традиционной вспашкой, которая одновременно выполняет роль ранней зяблевой обработки под яровые культуры, возможно проведение обработки почвы поверхностными широкозахватными орудиями (дискаторы, луцильники и другие), что позволяет провести своевременный посев пожнивных культур.

Ранние сроки сева пожнивных являются одним из определяющих факторов формирования урожая. Опоздание в августе с посевом всего лишь на 1 день приводит к недобору 14—17 ц/га зеленой массы. Поэтому сев пожнивных необходимо провести как можно раньше и завершить не позднее 10—12 августа, а в южных районах — до середины августа.