

УРОЖАЙНЫЙ ОГОРОД I



▲ Мечеслав СТЕПУРО,
Институт овощеводства,
доктор с/х наук

Что избавит от хвоща?

«Уже несколько лет пытаюсь избавиться от хвоща на своем участке, но прополка не помогает. Подскажите, что еще можно применить?»

Иван Леонидович,
д. Березно, Кобринский район


Хвощ полевой знаком каждому дачнику: это злостный сорняк, с которым воюют испокон веков. Особенно благоприятны для его роста и развития кислые почвы и влажные места.

По весне засоренные посевы бывают сплошь пропороты бледно-бурыми или красноватыми, сочными

неразветвленными стеблями, на конце которых находится колосок. После выброса спор он отмирает, и на том же месте летом образуются зеленые, до 40–50 см в высоту, сильноветвящиеся стебли. Какие агротехнические меры можно применить против этого сорняка?

Эффективно удушение хвоща полевого глубокой перекопкой почвы, поскольку с большой глубины он не всходит. Обессилит ненужное в огороде растение и тщательная выборка корневищ. К угнетению и истощению сорняка также приводит посев трав. Не забывайте о важности ручной прополки! Кроме того, кислый участок необходимо обязательно

произвестковать: можно применить доломитовую муку, известь или мел и т.п. Норма расхода данных материалов составляет в среднем 150–200 г/м². Проводить известкование почвы лучше осенью, но можно это сделать и весной – за 2–4 недели до посадки любой овощной культуры.



Как провести пикировку?

Многие овощные культуры выращивают рассадным способом. После получения сеянцев их пересаживают – пикируют в горшочки в предварительно заправленный субстрат. Горшочки, стаканчики и другие емкости перед этим дезинфицируют горячей водой или паром.

Не рекомендуется использовать для заправки огородную землю: обычно при поливах водой она заплывает и становится

слишком плотной. К тому же такая земля может быть заражена возбудителями различных болезней. Если вместо субстрата все-таки используется почвогрунт, он должен быть легкого механического состава, а также стерилизованным.

Перед пикировкой возраст сеянцев для растений **огурца** должен составлять 3–5 дней с момента всходов; **томата**, **перца сладкого** соответственно 10–12 дней; **баклажана** – 12–14 дней.

Как грамотно провести пикировку? Сначала в центре горшочка или

стаканчика в субстрате делается углубление, лучше специальной палочкой с перекладиной – это своего рода ограничитель глубины. Для **томата** и **перца сладкого** она должна составлять 4–5 см, для **огурца** и **баклажана** – 2,5–3 см. Затем сеянцы помещают в подготовленные углубления субстрата, вокруг стебелька засыпается почвогрунт. После этого проводят полив: под каждое растение нужно 15–20 мл воды.

Последовательность действий при пикировке показана на рисунке.

