

ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД РАЗМНОЖЕНИЯ АКТИНИДИИ

В январе–феврале срезать однолетние хорошо развитые побеги с маточной лианы, поставить в банку с водой в помещении на окно. Примерно через 20 дней начнут распускаться почки, а еще через 50–60 дней появившиеся из почек молодые побеги срезать у основания с «пяткой» (частью прошлогодней однолетней ветви).



Срезанные черенки поставить в банку с водой. После появления корешков черенки высадить на подготовленное место в теплице. Можно посадить их в ящик, заполненный на 4–5 см почвой и таким же слоем песка, и оставить в помещении при комнатной температуре.

Высаженные черенки надо обильно полить и закрыть баночками (или обрезанными бутылками) для поддержания высокой влаж-

ности воздуха. Через месяц побеги хорошо укоренятся и, если позволит погода, их можно перенести на грядку с обязательным притенением. Здесь они будут расти до конца сезона и останутся на зиму (желательно под укрытием из лапника или сухой листвы).

На постоянное место саженцы лучше высаживать весной, располагая около прочной опоры, с расстоянием 1,5–2 м друг от друга.

В посадочную яму глубиной 50 см надо уложить дренаж (битый кирпич, небольшие камни, ветки, шишки), внести 8–10 кг (ведро) перегноя или компоста, 100–200 г (2–3 горсти) суперфосфата, 30 г (2 ст. л.) сульфата калия (или 0,5 кг древесной золы), 20 г (1 ст. л.) аммиачной селитры.

Саженец не заглублять, обильно полить (2–3 ведра воды), замульчировать.

*Игорь ГАРАНОВИЧ,
кандидат биологических наук ЦБС НАН Беларуси*